

포울샷® 에이-팩

닭 대장균 자가백신

농장명 :

POULTRY
VACCINE1000
수분/병

PoulShot®

○ 제품명 : 포울샷® 에이-팩 (PoulShot® A-PEC)

○ 효능 및 효과

이 백신은 닭의 대장균증을 예방

○ 용법 및 용량

0.5ml를 총부 근육내에 접종

○ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉장소 (2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 6개월

○ 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 않 것

- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
- 2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

계군의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란율 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 닭에만 접종하십시오.
- 2) 지정된 축종 이외에는 안정성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 3) 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.
- 4) 사용설명서 (주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
- 5) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 ㈜중앙백신 연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 적용상의 주의

- 1) 사용 전, 본 백신을 더운 물에 잘 진탕하여 약 25℃ 전후가 되도록 하여 사용하십시오.
- 2) 멸균된 주사기구를 사용하여 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 3) 백신접종 시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 4) 백신 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 주사액을 뽑으며 주사시 팔관에 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- 5) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은백신은 집군의 혼합, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 6) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다.
- 7) 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을 피하십시오.

마. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하십시오.

○ 제조원

중앙백신 연구소

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37