

사용 설명서

포울샷® 감보로 (PoulShot® Gumboro)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1 수분 중)

가. 유효성분

° 전염성 에프(F)낭병 (IBDV, LZD 228-JAC3주) -----
-----10^{2.0}TCID₅₀/dose이상

나. 첨가제

° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨,
L-글루탐일나트륨, 젤라틴

2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적제제

나. 성상 : 노란백색 동결건조분말제제이며 희석액을 가하여 흔들면 쉽게 균등한 현탁액이 됨

3. 효능 및 효과

닭의 전염성 에프(F)낭병의 예방.

4. 용법 및 용량

가. 접종시기

1) 육계병아리 : 10~14일령 1회 음수 접종

2) 종계 및 산란계 : 10~14일령 1회 음수, 10~12주령 보강 접종

나. 접종방법

방부제가 함유되지 않는 희석액(지하수)을 아래와 같이 준비하여 음수 투여

적용시기	1,000수분* 기준희석	2,000수분 기준희석
1일령	1L	2L
10일령	10L	20L
40일령	40L	80L

* 병아리 일령이 높아갈수록 기준 희석량 1L씩 증가

* 희석음수는 지하수로서 산, 알칼리도가 강하지 않은 것이 좋으며, 탈지분유를 0.2% 가하여 사용하고, 수질이 나쁠 때는 0.4%를 가하여 사용하면 좋습니다.

* 수돗물을 사용할 때는 반드시 끓인 후 냉각시키든가, 24시간 방치 후 사용하며, 탈지분유를 0.2~0.4% 되게 첨가하는 것이 좋습니다.

5. 포장단위

2,000수/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.

2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

닭의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 경미하고 일시적인 호흡기 증상, 원기손실, 식욕부진, 산란율 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 의사사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

1) 반드시 건강한 닭에만 접종하십시오

2) 닭의 모체이행항체수준, 일령, 건강상태, 재접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.

3) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

4) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

5) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

6) 접종 시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

7) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장비를 착용하여 직접적 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.

8) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사 진료를 받으십시오

9) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신 연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 적용상의 주의

1) 음수 접종 시 주의사항

- 가) 음수접종 시 급수기 및 급수통을 청결하게 세척한 후 사용하십시오.
- 나) 백신을 희석하는 물은 소독약이나 오염물질이 없는 깨끗한 물을 사용하십시오.
- 다) 희석된 백신을 열이나 직사광선 등에 노출시키지 마십시오.
- 라) 백신 전 48시간과 백신투여 후 24시간 이내에는 소독제를 투여하지 마십시오.
- 마) 백신이 용해된 음수액이 모두 소비되면 소독제가 함유되지 않은 깨끗한 물로 정상적인 급수를 실시하십시오.
- 바) 희석한 백신은 늦어도 2시간 이내에 모두 마실 수 있도록 하며, 2/3 이상의 닭이 동시에 마실 수 있게 하십시오.
- 사) 백신투여 전에 일정시간(더운 날씨에는 최소 2시간, 시원한 날씨에는 최소 4시간 이상) 음수의 공급을 제한하며, 백신용해액이 다 소모되기 전에 음수를 추가공급하지 마십시오.
- 아) 음수용기는 청결한 지하수로 깨끗이 닦아야 하며, 소독약은 절대 사용하지 마십시오.
- 자) 희석음수는 지하수로서 산, 알칼리도가 강하지 않은 것이 좋으며, 탈지분유를 0.2% 가하여 사용하고, 수질이 나쁠 때는 0.4%를 가하여 사용하면 좋습니다.
- 차) 수돗물을 사용할 때는 반드시 끓인 후 냉각시키든가, 24시간 방치 후 사용하며, 탈지분유를 0.2~0.4% 되게 첨가하는 것이 좋습니다.
- 카) 백신의 효력을 저해하지 않게 항균제를 포함한 음수투여약제와 음수소독약은 3~5일전에 사용을 중지하십시오.

2) 그 외 적용상 주의사항

- 가) 본제는 백신 접종 직전에 용해하며 용해한 백신은 충분히 섞은 후 바로 사용하십시오.
- 나) 접종 전에는 반드시 백신의 성상 및 이물의 혼입여부 등을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
- 다) 안전성 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 제제(백신, 항생제, 영양제 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 라) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

바. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 4) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 5) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 6) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.