

사용 설명서

포울샷® S/9R
(PoulShot® S/9R)

1. 원료약품 및 분량 (1수분 중)

가. 유효성분

° *Salmonella gallinarum* (9R strain)-----2×10⁷ CFU 이상

나. 첨가제

° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐일나트륨, 젤라틴

2. 성상

백색의 건조괴이며 이물 이취가 없고 용해하면 균일한 현탁액이 된다.

3. 효능 및 효과

산란계의 가금티푸스를 예방한다.

4. 용법 및 용량

백신을 동봉된 용해용 희석액에 희석하여 0.2ml씩 접종한다.

가. 1차 접종

6~8주령의 닭에 희석한 백신 0.2ml를 경부피하에 접종한다.

나. 2차 접종

1차 접종 12주 후(18~20주령)에 동일한 방법으로 접종한다.

5. 포장단위

1,000수분/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 2~8℃의 냉장소에 저장

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 반드시 건강한 닭에만 접종하십시오.

나. 종계에는 절대 사용하지 마십시오.

다. 반드시 권장 용법 및 용량을 따르십시오.

라. 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.

마. 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.

바. 가금티푸스가 발생중인 농장에는 접종시 피해가 증진될 수 있습니다.

사. 백신접종 7일 전부터 접종 후 14일 까지는 전신성 치료제 및 항생제 사용을 하지 마십시오.

아. 희석된 백신은 2시간 이내에 모두 사용해야 합니다.

자. 개봉한 백신은 신속히 사용하여야 하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

차. 백신 취급 전 후에는 손을 깨끗이 닦고 접종이 끝난 후에는 빈병과 사용한 도구는 안전하게 폐기하십시오.

카. 반드시 멸균된 주사기를 사용하십시오.

타. 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용 하십시오

파. 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소 또는 판매업소에 문의하십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

PI-167J-01

S/9R

S/9R