

사용 설명서

펠리샷® 피에이치씨 (FeliShot® PHC)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

가. 유효성분

- Feline Panleukopenia virus-----10^{4.8}TCID₅₀이상
- Feline Herpesvirus-----10^{6.2}TCID₅₀이상
- Feline Calicivirus-----10^{6.2}TCID₅₀이상

나. 면역증강제

- Montanide™ Gel 01-----10%

다. 보존제

- Formalin-----0.2%이하

2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적 제제,

나. 성상 : 진한 분홍색의 유탁주사액으로 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

3. 효능 및 효과

이 백신은 고양이 범백혈구감소증(Feline panleukopenia), 고양이 바이러스 비기관지염(Feline Viral rhinotracheitis), 고양이 칼리시바이러스 감염증(Feline calicivirus infection) 예방을 목적으로 사용합니다.

4. 용법 및 용량

가. 접종시기 : 첫 백신접종은 8주령 전후에 실시하며, 3~4주 간격으로 추가 접종한다. 기초 면역된 고양이는 매년 1회씩 보강 접종한다.

나. 접종방법 : 1ml를 피하 또는 근육 접종부위에 접종한다.

5. 포장단위

1ml(1두)/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 2) 열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 동물, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 1) 개체에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토, 경련 등의 과민반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 과민반응 시에는 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 피하주사 후 주사부위의 통증, 종창, 경결 등이 나타날 수 있으므로 주사 후 마사지를 충분히 해주십시오.

다. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 고양이에게만 접종하십시오.
- 2) 어미고양이의 백신접종여부, 접종횟수, 감염여부에 따라 새끼고양이의 면역형성이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 접종하십시오.
- 3) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 4) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 5) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 6) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 7) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠악축 등에 대한 투여

임신 중인 고양이에게 사용하지 마십시오.

마. 적용상의 주의

- 1) 백신을 사용 전에 충분히 흔들어 내용액을 균일하게 한 후 사용하십시오.
- 2) 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 3) 멸균된 주사기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 4) 주사방법이 잘못되면 동통, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
- 5) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 6) 주사시 주사통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.
- 7) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

바. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 4) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 5) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 6) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.