

국가출하승인검정필 / 동물용의약품

포울샷®

플루-Y280

저병원성 AI (Y280)
사독 오일백신



1000
수분/병

제품명 : 포울샷® 플루-Y280 (PoulShot® Flu-Y280)

원료약품 및 분량(본제 1수분 중)

가. 유효성분

저병원성 조류인플루엔자 바이러스

(AIV, rgtH5314 strain, H9N2 Y280 lineage).....10^{8.0} EID₅₀ 이상

나. 면역증강제

CAvant® WO-60.....60% 이상

다. 보존제

Formalin.....0.2% 이하

제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적 제제

나. 성상 : 백색의 유탁주사액으로 정치하면 약간의 침전층이 생기나 진탕하면 균일한 액체가 되며, 이물 및 이취가 없음

효능 및 효과

닭의 저병원성 조류인플루엔자(H9N2, Y280 lineage)

감염증의 예방 및 경감

용법 및 용량

사용 전 충분히 흔들어준 후 다음과 같은 방법으로 접종할 것

가. 접종 시기 : 산란 3주 전까지 접종

나. 접종 방법 : 본제 1수분(0.5ml) 근육 접종

다. 육계에서 사용은 금함

포장단위 : 1,000수분/병

저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소 (2~8℃)에 보관

나. 유효기간 : 제조일로부터 12개월

제조원

중앙백신 연구소

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

www.cavaclub.com

주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 스트레스를 받은 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

닭의 위생상태에 따라 간혹 백신 접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 일시적인 산란 저하 등의 반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의사항

1) 닭의 모체이행항체 수준, 일령, 건강상태, 다른 백신 접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으므로 이를 고려하여 접종하십시오.

2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

4) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확인되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

5) 접종시기산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신 접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

6) 취급자는 장갑, 마스크 및 보호의 등 보호장비를 착용하여 약물의 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.

7) 약용 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

8) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 적용상의 주의사항

1) 백신을 사용 전에 충분히 흔들어 내용물을 균일하게 한 후 사용하십시오.

2) 사용 전 본 백신을 약 25℃ 전후가 되도록 하여 사용하십시오.

3) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 수 행을 원칙으로 사용하십시오.

4) 접종 방법이 잘못되면 동중, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.

5) 환경이 불량하거나 접종 부위가 오염된 경우에는 접종 부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 접종 부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.

6) 접종 시 동중으로 인해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전에 주의하십시오.

7) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

8) 백신 접종 시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.

9) 백신 용기의 고무마개를 70% 알코올 등으로 소독하여 건조한 후 백신액을 뽑으며 접종 시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.

10) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 집군의 혼합 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

11) 백신을 인체에 잘못 접종한 경우, 염증과 동물이 발생할 수 있으므로 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.

12) 접종 시 혈관이나 흉선을 찌르면 접종 부위의 출혈 및 안면의 종창 등 부작용이 발생하니 정확한 부위에 접종하십시오.

마. 휴약기간 : 없음

바. 저장상의 주의사항

1) 직사광선, 기온 또는 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.

2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.

4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기 처리 하십시오.

5) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

6) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.

제조번호 Lot :

유효기한 Exp :