



사용 설명서

수이샷® 플루-3

(SuiShot® Flu-3)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

가. A/Sw/Kor/CAN1/04(H1N1, KCTC 11165BP)	100 HAU 이상
나. A/Sw/Kor/K1/05(H1N2, KCTC 18132P)	100 HAU 이상
다. A/Sw/Kor/CA04/05(H3N2, KCTC 11167BP)	200 HAU 이상
라. Adjuvant (부기 1.)	30%
마. 불활화제 (부기 2.)	0.2% 이하

2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적 제제

나. 성상 : 노란백색의 수성현탁주사액으로 약간의 침전이 있으나 흔들면 균등한 액체가 되며 이물 및 이취가 없고 내용물의 성상이 균일함.

3. 제조방법

별첨 1.

4. 효능 및 효과

이 백신은 돼지 인플루엔자 바이러스 3가 불활화 백신으로서 돼지 인플루엔자 바이러스 (Swine influenza virus) 혈청형 H1N1, H1N2, H3N2의 예방을 목적으로 사용.

5. 용법 및 용량

가. 접종시기

- 1) 자돈 : 생후 3~7주령 1차 접종, 1차 2주 후에 2차 접종
- 2) 후보돈 : 첫 종부 4~5주 전 1차 접종, 1차 2주 후에 2차 접종
- 3) 경산모돈 : 매 종부 2~3주 전 접종

나. 접종방법

1두당 2.0mℓ씩 이근부 근육에 접종

6. 포장단위

5두/병, 10두/병, 15두/병, 25두/병, 50두/병

7. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소 (2-8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

나. 다음 환축에게는 신중히 투여할 것

- 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.
- 2) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
- 3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

다. 부작용

- 1) 주사 후 일과성의 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타낼 수 있습니다.
- 2) 주사 후 14일 이내에는 주사부위에 반흔이 남아있을 수 있으므로 출하 14일 이내의 돼지에는 접종하지 마십시오.

라. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 돼지에만 접종하십시오.
- 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 6) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

마. 적용상의 주의

- 1) 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 2) 멸균된 주사기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 3) 백신 접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 4) 희석액과 백신액을 뽑을 때, 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 뽑으며 주사 시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 5) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의

혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

- 6) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.
- 7) 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을 피하십시오.

바. 저장상 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 5) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

9. 시험기준 및 시험방법

국가검정 동물용의약품 검정기준에 준함.

10. 비고

국가검정용 동물용의약품임.

중앙백신 연구소

042-863-9308
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37