



사용 설명서

수이샷® 올레스

(SuiShot® Allres)

1. 원료약품

- *Bordetella bronchiseptica*
- *Pasteurella multocida* type A
- *Pasteurella multocida* type D
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 2
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 5
- *Mycoplasma hyopneumoniae*
- *Bordetella bronchiseptica* cDNT
- *Pasteurella multocida* type D cDNT
- *Pasteurella multocida* type A OMP
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 2 toxin
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 5 toxin
- *Streptococcus suis* type 2
- *Haemophilus parasuis* serotype 1
- *Haemophilus parasuis* serotype 4
- *Haemophilus parasuis* serotype 5
- Immulant-a
- Formalin
- 치메로살

2. 제형 및 성상

회백색의 균일한 현탁액이며 정치하면 백신 내용물의 침전이 생기나 흔들면 쉽게 균등액이 되며 소분된 내용물의 성상이 균일하고 이물 이취가 없다.

3. 제조방법: -

4. 효능 및 효과

돼지위축성비염, 돼지파스튜렐라페렴, 돼지글래씨씨병, 돼지홍막페렴, 돼지연쇄상구균감염증, 돼지유행성페렴을 예방

5. 용법 및 용량

가. 접종방법, 접종부위 및 접종량

모돈 : 1차접종 : 분만 4-5주전, 이근부근육, 2.0ml/두

2차접종 : 1차 접종 2주후, 이근부근육 2.0ml/두

자돈 : 1차접종 : 생후 3-4주령, 이근부근육, 1.5ml/두

2차접종 : 1차 접종 2주후, 이근부근육, 1.5ml/두

웅돈, 후보돈 : 1차접종 : 첫 종부 4-5주전, 이근부근육, 2.0ml/두

2차접종 : 1차 접종 2주후, 이근부근육, 2.0ml/두

6. 포장단위

10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml

7. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉장소(2~8℃)에 보관

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

가. 접종상의 주의

- 1) 반드시 건강한 돼지에만 접종합니다.
- 2) 백신접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 3) 반드시 멸균된 주사기구를 사용합니다.
- 4) 사용 전, 본 백신을 더운 물에 잘 진탕하여 약 25℃ 전후가 되도록 하여 사용하십시오. 사용 중에도 가끔 따뜻하게 진탕해 주십시오.
- 5) 백신 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 주사액을 뽑으며 주사시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 6) 주사바늘은 1마리 마다 바꾸어 주십시오.
- 7) 백신 접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을 피하도록 해 주십시오.

나. 대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

다. 다음 동물에는 신중하게 접종하십시오.

- 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.
- 2) 질병 치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
- 3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

라. 주사 후 일과성의 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타내지만, 통상 3일 내에 회복됩니다.

마. 주사 후 30일 이내에는 주사 부위에 반흔이 남아있을 수 있으므로 출하 30일 이내의 돼지에는 접종하지 마십시오.

바. 취급상의 주의

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.

- 2) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력 저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
 - 3) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
 - 4) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하십시오.
 - 5) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받습니다.
- 사. 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.
- 아. 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소에 문의하십시오.

9. 시험기준 및 시험방법

국가검정 동물용의약품 생물학적제제 검정기준에 따른다.

10. 비고

국가검정 동물용의약품임.

중앙백신 연구소

042-863-9308
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37