

사용 설명서

포울샷® 라링고 (PoulShot® Laryngo)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1수분 중)

- 가. 유효성분
° 닭 전염성 후두기관염 바이러스 감염계태아 조직유제액(ILTV, 대전주) -----10^{2.5}EID₅₀ 이상
- 나. 첨가제
° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐일나트륨, 젤라틴, 페니실린, 황산스트렙토마이신

2. 제형 및 성상

- 가. 제형 : 생물학적제제
나. 성상 : 연한분홍색의 동결건조가루이며 푸른색의 점안용 희석액을 가하여 흔들면 균등한 현탁액이 됨

3. 효능 및 효과

닭 전염성 후두기관염의 예방

4. 용법 및 용량

- 가. 접종시기
건강한 4주령 병아리를 접종하되 긴급을 요할 때는 2주령 정도의 병아리도 접종 가능하며 종계나 산란계의 경우는 16주내지 20주령에 추가접종 권장
- 나. 접종방법
동봉된 희석액으로 용해하여 병아리 눈에 백신 1방울(0.03ml)을 접종

5. 포장단위

1,000수/병

6. 저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관
나. 용기종류 : 밀봉용기
다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것
- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
 - 2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 1) 닭의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란을 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 닭의 백신접종 후 관찰되는 반응으로 접종 4~5일 후에 안면부종, 결막염 등의 증상이 나타날 수 있으나 7~8일 후에는 소멸합니다.

다. 일반적 주의

- 1) 닭의 모체이행항체수준, 일령, 건강상태, 재접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.
- 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 6) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 적용상의 주의

- 1) 희석된 백신은 열이나 직사광선 등에 노출시키지 마십시오.
- 2) 본제는 백신 접종 직전에 용해하며 용해한 백신은 충분히 섞은 후 바로 사용하십시오.
- 3) 접종 전에는 반드시 백신의 성상 및 이물의 혼입여부 등을 관찰하고 이상이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 4) 안전성 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 제제(백신, 항생제, 영양제 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 5) 백신 전 48시간과 백신투여 후 24시간 이내에는 소독제를 투여하지 마십시오.
- 6) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수술 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.
- 7) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장비를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 8) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

마. 저장상의 주의사항

- 1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- 2) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 4) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

PI-060J-02