

사용 설명서

포울샷® 에이피 (PoulShot® AEP)

1. 원료약품 및 분량(본제 1수분 중)

가. 유효성분

- 닭 뇌척수염 바이러스(AEV, Calnek주)----- $10^{2.0} \text{EID}_{50}$
- 계두바이러스(Fowl Pox Virus, 나가노주)----- $10^{2.0} \text{EID}_{50}$

나. 첨가제

- 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨,
L-글루탐일나트륨, 젤라틴

2. 제형 및 성상

제형 : 생물학적제제

성상 : 갈황색의 건조괴이며, 이물, 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

3. 효능 및 효과

닭 뇌척수염 및 계두의 예방

4. 용법 및 용량

가. 접종시기

1) 10~16주령 사이에 접종하되, 산란개시 4주전에 백신접종을 마치도록 합니다.

나. 접종방법

1) 동봉된 접종침에 예방액을 묻혀서 날개의 익막부 삼각형 중심부에 관통시킵니다.

2) 희석한 백신은 1~2시간 내에 완전히 투여 한다.

5. 포장단위

1,000수/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소($2 \sim 8^{\circ}\text{C}$)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
- 2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

닭의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란율 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

- 1) 닭의 모체이행항체수준, 일령, 건강상태, 재접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.
- 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 3) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 4) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 5) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 6) 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 7) 취급자는 장갑, 마스크 및 보호의 등 보호장비를 착용하여 약물의 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 8) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 9) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

PI-088J-02

라.적용상의 주의

- 1)사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 2)사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 3)멸균된 침을 사용하며 1수 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 4)접종방법이 잘못되면 통증, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
- 5)접종시 날개부위의 익막위치에 혈관을 피하고 접종침이 날개막을 관통하지 않도록 접종하십시오.
- 6)환경이 불량하거나 접종부위가 오염된 경우에는 접종부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 접종부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 7)접종 시 통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.
- 8)각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

마.저장상의 주의사항

- 1)직사일광, 가온 또는 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 2)안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- 3)유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 4)유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 5)빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 6)외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.