

사용 설명서

캐니샷® 알브이-에프 (CaniShot® RV-F)

1. 원료약품 및 분량(본제 1두분 중)

가. 유효성분

° Canine Rabies virus($10^{7.0}$ FAID₅₀/ml이상)----- 80%

나. 첨가제

° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨,
L-글루탐일나트륨, 젤라틴

다. 용제

° Potassium phosphate ----- 0.1M

2. 성상

가. RV-F

회백색의 건조괴이며 용해용 용액에 쉽게 용해되어 균일한 현탁
이 되며 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일하여야
한다.

나. DRV-F

무색의 용액이며 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일
하여야한다.

3. 효능 및 효과

광견병 바이러스 불활화 백신으로서 동물(개, 고양이, 소)의 광견병을
예방할 목적으로 사용한다.

4. 용법 및 용량

광견병 사독 건조 백신(RV-F)을 명시된 희석액(DVR-F)으로 용해하여
접종한다.

가. 1차 접종

생후 3~4개월 이상 된 동물(개, 고양이, 소)의 피하 또는 근육내로
1ml 접종한다.

나. 추가 접종

1차 면역된 동물(개, 고양이, 소)은 1년 간격으로 보강 접종한다.

5. 포장단위

1두분/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 접종상의 주의

- 1) 반드시 건강한 동물(개, 고양이, 소)에만 접종합니다
- 2) 멸균한 주사기구를 사용합니다.
- 3) 1두 1침을 사용하십시오.
- 4) 임신한 동물(개, 고양이, 소)에는 백신접종을 하지 마십시오.

나. 접종대상 개가 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

다. 다음 동물에는 면역반응이 저하될 수 있으므로 신중하게 접종하십시오.

- 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 동물.
- 2) 심한 스트레스(환경불량 등)를 받은 경우.
- 3) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
- 4) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

라. 접종 후 일시적인 발열, 원기소실, 식욕부진 등을 나타낼 수 있습니다.

백신접종 후 적어도 1주간은 안정시키고 스트레스(목욕, 이동 등)를 피
하도록 해 주십시오.

마. 취급상의 주의

- 1) 지정된 저장방법을 준수하십시오.
- 2) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하
십시오.
- 3) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 4) 변색되었거나 비진공된 백신은 사용하지 마십시오.
- 5) 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하십시오.
- 6) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수
있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또
는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과
진찰을 받습니다.

바. 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.

사. 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소에 문의하십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

CI-165A-01