

사용 설명서

캐니샷® 켄넬코프-플러스 (CaniShot® KC-plus)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분중)

가. 유효성분

- *Bordetella bronchiseptica*(S-55) -----2.0×10⁸ CFU 이상
- Canine Parainfluenza(D008)-----10^{4.0} HAD₅₀ 이상

나. 첨가제

- 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐일나트륨, 젤라틴

2. 제형 및 성상

생물학적 제제, 노란 백색의 용액용 동결건조 분말제제이며 사용 시 전용희석액에 녹였을 때 이물, 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

3. 효능 및 효과

이 백신은 개 전염성호흡기 질환인 Kennel cough의 감염증을 예방할 목적으로 사용한다.

4. 용법 및 용량

가. 접종시기 : 생후 3주령 이상된 개에 2주 간격으로 2회 접종한다.

나. 접종방법 : 동봉된 희석용액으로 백신을 용해한 후, 주사바늘을 제거하고 동봉된 팁을 부착하여 양쪽 비강내에 0.25ml씩 서서히 주입한다.

다. 접종상의 주의사항 : 기초 면역된 개는 매년 1회씩 추가 접종한다.

5. 포장단위

1두/병

6. 저장방법 및 유효방법

가. 저장방법 : 2~8℃의 냉장소에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 2) 열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 동물, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 1) 개체에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토, 경련 등의 과민반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 과민반응 시에는 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 백신 접종후 2~3일간 쿽쿽 거릴수 있으나 치료하지 않아도 자연적으로 회복된다.

다. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 개에게만 접종하십시오.
- 2) 모건의 백신접종여부, 접종횟수, 감염여부에 따라 자건의 면역형성이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 접종하십시오.
- 3) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 4) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 5) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 6) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 7) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 8) 비강 내 접종용으로만 사용하십시오.
- 9) 반드시 동봉된 접종 팁을 사용하십시오.
- 10) 어린강아지에 비강내로 급하게 주입 시 호흡장애를 유발할 수 있으므로 서서히 주입하십시오.
- 11) 백신접종 전후에 항균성 약제를 투여하면 체내에서 백신균의 증식이 억제되어 면역이 형성되지 않을 수 있습니다.

라. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠악축 등에 대한 투여
임신 중인 개에 사용하지 마십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

CI-160A-01

마. 적용상의 주의

- 1) 백신을 사용 전에 충분히 흔들어 내용액을 균일하게 한 후 사용하십시오.
- 2) 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 3) 멸균된 주사 기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 4) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

바. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 5) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.