

# 사용 설명서

## 캐니샷® 디에치피피엘 (CaniShot® DHPPL)

### 1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

캐니샷® 디에치피피

가. 유효성분

- ° 개 디스토포바이러스 조직배양세포 감염배양액-----30%
- ° 개 아데노바이러스 2형 조직배양세포 감염배양액-----10%
- ° 개 파보바이러스 조직배양세포 감염배양액 -----20%
- ° 개 파라인플루엔자바이러스 조직배양세포 감염배양액 ----20%

나. 첨가제

- ° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨,  
L-글루탐일나트륨, 젤라틴

캐니샷® 렘토

가. 유효성분

- ° 렘토스피라 캐니콜라 배양액 -----0.5ml
- ° 렘토스피라 익태로 헤모라지 배양액-----0.5ml

나. 보존제

- ° 치메로살 -----0.01%

### 2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적 제제

나. 성상

1) 캐니샷® 디에치피피

노란백색의 동결건조분말제제로서 이취가 없고 내용물의 성상이 균일함

2) 캐니샷® 렘토

밝은 빨강색의 수성주사액으로써 이물, 이취가 없고 내용물의 성상이 균일함

### 3. 효능 및 효과

이 백신은 개 디스토포, 전염성간염(개 아데노바이러스 2형), 파보바이러스, 파라인플루엔자 및 렘토스피라 감염증의 예방을 목적으로 사용

### 4. 용법 및 용량

캐니샷® 디에치피피 1두분을 캐니샷® 렘토 1두분(1ml)으로 완전히 용해한 다음 개의 피하 또는 근육에 접종

### 5. 포장단위

가. 캐니샷® 디에치피피

1두/병

나. 캐니샷® 렘토

1두/병

### 6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

### 7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 2) 열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 동물, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 1) 개체에 따라 간혹 백신접종 후에 일시적인 발열, 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토, 경련 등의 과민반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 과민반응 시에는 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 피하주사 후 주사부위의 통증, 종창, 경결 등이 나타날 수 있으므로 주사 후 마사지를 충분히 해주십시오.
- 3) 아나필락시스 반응(급성쇼크증상)이 나타날 때에는 곧바로 가까운 동물병원에 방문하십시오.
- 4) 수의사의 경우 아나필락시스 반응(급성쇼크증상)이 나타날 때에는 에피네프린을 투여하십시오.

다. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 개에게만 접종하십시오.
- 2) 모건의 백신접종여부, 접종횟수, 감염여부에 따라 자견의 면역형성이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 접종하십시오.
- 3) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 4) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 5) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 6) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 7) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

라. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠악축 등에 대한 투여

임신중인 개에는 가급적 사용하지 마십시오.

마. 적용상의 주의

- 1) 백신을 사용 전에 충분히 흔들어 내용액을 균일하게 한 후 사용하십시오.
- 2) 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 3) 멸균된 주사기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 4) 주사방법이 잘못되면 동통, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
- 5) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 6) 주사시 주사통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.
- 7) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

**중앙백신** 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

CI-098A-01

바. 저장상의 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 4) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 5) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 6) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.