

# 사용 설명서

보비샷® 리드  
(BoviShot® RID)

## 1. 원료의 조성성분 및 분량(본제 1두분 중)

가. 유효성분

◦ 불활화된 소의 전염성비기관염 바이러스 조직배양세포감염 배양액 -----30%

◦ 불활화된 소의 바이러스성하리증 바이러스 조직배양세포 감염 -----30%

◦ 불활화된 소의 파라인플루엔자-3 바이러스 조직배양세포 감염 -----30%

나. 면역증강제

◦ 수산화 알루미늄겔(90%)-----10%

다. 보존제

◦ 포르말린 ----- 0.2%

## 2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적제제

나. 성상 : 연한분홍색의 수성현탁주사액으로 정치하면 백신 내용물의 침전이 생기나 흔들면 쉽게 균등액이 되며, 이물 및 이취가 없고 내용물의 성상이 균일함.

## 3. 용법 및 용량

가. 접종시기 : 3개월령 이상의 송아지 및 성우

나. 접종방법 : 4주일 간격으로 5ml씩 2회 근육 내에 주사

## 4. 효능 및 효과

소의 전염성비기관염, 바이러스성 하리증 및 파라인플루엔자 예방

## 5. 포장단위

2두/병

## 6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 18개월.

## 7. 주의사항

가. 사용 전에 사용설명서를 충분히 참조하십시오.

나. 수의사의 처방이나 지시에 따라 사용하십시오.

다. 건강한 소에만 접종하십시오.

라. 백신병을 충분히 흔들어 내용물을 균일하게 한 후 사용하십시오.

마. 멸균주사기를 사용하며 주사바늘은 1두 1침의 원칙을 지키십시오.

바. 백신은 직사광선을 피하십시오.

사. 쓰다 남은 백신은 잡균의 혼입 또는 효력이 감퇴할 우려가 있으니 보관 후 재사용하지 말고 위생적으로 폐기하십시오.

아. 스트레스 요인이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

자. 사용 전에 백신이 25℃전후로 한 후 사용하십시오.

차. 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.

카. 자세한 사항은 제조회사 또는 판매업소에 문의하십시오.